

Organização Mundial da Saúde

32 MILHÕES

DE CRIANÇAS VIVEM COM PERDA AUDITIVA

60% DAS PERDAS AUDITIVAS NA INFÂNCIA PODEM SER PREVINIDAS

INFECÇÕES 31%

Papeira · Rubéola · Meningite · Sarampo · Otite

CAUSAS RELACIONADAS COM PARTO 17%

Complicações no parto · Prematuridade · Baixo peso ao nascer

MEDICAMENTOS OTOTÓXICOS 4%

OUTRAS CAUSAS* 8%

*Entre elas as pré-natais, como o abuso de sustâncias e enfermidades metabólicas

CONSEQUÊNCIAS SE NADA FOR FEITO



ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Fortalecer os programas de atenção à saúde de mães e filhos, incluindo a imunização e as organizações de pessoas com perda auditiva

Formar profissionais de saúde quanto às questões fonoaudiológicas

Regulamentar e monitorar o uso de medicamentos ototóxicos e o ruído ambiente

Aplicar testes de detecção precoce nos lactentes e nas escolas

Disponibilizar dispositivos auditivos e terapias de comunicação

Sensibilizar a opinião pública para proteger a audição e reduzir o preconceito

PERDA DA AUDIÇÃO NA INFÂNCIA

AJA AGORA. SAIBA COMO.

Tradução: DesculpeNaoOuvi.com.br

www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/en